

UPRAWA TYMOTKI ŁĄKOWEJ

Wymagania glebowe:

Tymotka łąkowa ma małe wymagania glebowe, może być uprawiana na różnych typach dostatecznie uwilgotnionych gleb. Tymotka nie jest odporna na susze.

Siew:

Zalecany wysiew na plantacji nasiennej 3-5kg/ha nasion, szer. międzyrzędzi 40cm . Zakładanie plantacji nasiennych: jesienią jako wsiewka w zboża ozime (siew trawy w terminie siewu zboża) oraz wiosną jako wsiewka w zboża jare.

Nawożenie:

Po zbiorze rośliny towarzyszącej należy zastosować pełne nawożenie NPK, możliwie niezwłocznie, w ilościach N - 30 kg/ha, P₂O₅ 70-100 kg/ha, K₂O - 100-120 kg/ha. Nawożenie azotowe w każdym roku użytkowania plantacji: jesienią w drugiej połowie października w ilości 30kg N/ha, oraz wiosną w końcu kwietnia lub na początku maja 50-60kg N/ha .

Ochrona tymotki łąkowej:

Niszczanie chwastów dwuliściennych w zbożach Aminopielik D 450 SL 3l/ha lub Chwastox D 179 SL 5l/ha. Niszczanie chwastów dwuliściennych po zbiorze rośliny ochronnej mieszanką Chwastox Extra 300SL 1,5/ha, Aminopielik D 1,5l/ha i Starane 250SL 0,6l/ha. Niszczanie chwastów dwuliściennych i jednoliściennych (miotła zbożowa, wiechlina roczna, chwastnica, kurze proso) jesienią w końcu września lub na początku października lub wczesną wiosną– Stomp 330 EC w dawce 5l/ha. Szersze działanie na chwasty jednoliścienne posiada środek Dual Gold 960EC do zastosowania wiosną w dawce 2l/ha. Niszczy on również samosiewy zbóż. Przy dużym nasileniu plantacji tymotki istnieje zagrożenie wystąpienia szkodnika kłósnicy tymotnicy, która uszkadza młode zawiązki kłosek i kwiatków. Należy opryskać plantacje preparatem owadobójczym np. Owadofos 540Ec w dawce 1l/ha, w terminie kwitnienia drzew wiśniowych.

Zbiór:

Termin dojrzewania przypada na koniec lipca. Zbiór nasion dwufazowy. Koszenie na pokosy 2-3 dni od początku osypywania się nasion. Omłot po 2 tygodniach Zalecany okres użytkowania plantacji nasiennych 2 lata..

Uprawa tymotki łąkowej została opracowana wg zaleceń Hodowli Roślin Bartązek.