

UPRAWA ŻYCICY WESTERWOLDZKIEJ

Wymagania glebowe:

Wymaga gleb żyznych, dobrze nawodnionych. Najlepszymi przedplonami pod uprawę życicy westerwoldzkiej są rośliny okopowe, strączkowe i rzepak. Życica ta udaje się również po zbożach, jednakże wymaga zwiększonego nawożenia mineralnego.

Siew:

Plantacje nasienne należy zakładać w siewie późnoletnim (25 sierpnia – 10 września) 16-18 kg/ha. Ze względu, że jest to forma jaro-ozima, możliwy jest siew wiosenny, jednakże plon nasion i suchej masy w takiej sytuacji jest niższy.

Nawożenie:

Nawożenie przedsiewne 30-50kg N/ha, 80kg P₂O₅/ha, 100kg K₂O/ha. Nawożenie pogłównie N wiosną w okresie ruszenia wegetacji 50-75kg/ha .

Ochrona życicy westerwoldzkiej:

Niszczanie chwastów dwuliściennych środkami Aminopielik D 4560 SL 3l/ha lub Chwastox D 179 SL 5l/ha. Niszczanie chwastów dwuliściennych trudnych mieszanką Chwastox Extra 300SL 1,5/ha, Aminopielik D 1,5l/ha i Starane 250SL 0,6l/ha nie wcześniej niż w fazie pełnego krzewienia roślin życicy. Niszczanie chwastów jednoliściennych wiosną środkiem Dual Gold 960EC w dawce 2l/ha. Możliwość zastosowania antywylegacza w fazie początku strzelania źdźbło (pierwszego kolanka) – oprysk środkiem Moddus 250 EC w dawce 0,75-0,8l/ha. Możliwość stosowania środków przyspieszających i wyrównujących dojrzewanie łanu np. Harvade 250 SC (2/ha) lub Roundup do 2,5l/ha (przy likwidacji plantacji).

Zbiór:

Zbioru należy dokonać w I lub II dekadzie lipca, przy pełnej dojrzałości nasion możliwy jest zbiór jednofazowy kombajnem. W sprzyjających warunkach meteorologicznych istnieje możliwość drugiego zbioru. Zaleca się użytkowanie plantacji nasiennej przez 1 rok.

Uprawa życicy westerwoldzkiej została opracowana wg zaleceń Hodowli Roślin Bartązek.