



Zalecenia produkcyjne – ziemniak jadalny

- Regularny kształt i wielkość bulw
- Wysoki plon
- Atrakcyjna czerwona skórka
- Wysoka zawartość suchej masy
- Dobra odporność na parcha zwykłego



Charakterystyka odmiany

Dojrzałość	56	Średnio-późna
Okres spoczynku	73	Długi
Plon	109	Wysoki
Wielkość bulw	82	Duże
Kształt bulw		Owalne
Ilość bulw		9-11
Kolor skórki		Czerwony
Kolor miąższu po gotowaniu		Jasnożółty/kremowy
Typ kulinarny		B – lekko mączysty
Sucha masa/Skrobia		20,9% / 15,1%
UWW/Ciężar właściwy		385 / 1,083
Uszkodzenia wewnętrzne	3	Niewrażliwa
Wrażliwość na metrybuzynę	50	Średnio wrażliwa



Kolor skórki i miąższu



Typ kulinarny



Dojrzałość

Gęstość sadzenia

kalibraż	obsada/ha	Rozstaw redlin	
		75 cm	90 cm
28/35	53.500	25	20
35/55	44.500	30	25
50/60	40.500	33	28

Głębokość sadzenia: normalna.

W celu dokładnej kalkulacji obsady zawsze należy przeliczyć liczbę bulw w 50kg.

Odporność na choroby

Zaraza liści	46	● ● ● ● ●
Zaraza bulw	63	● ● ● ● ●
Alternarioza	60	● ● ● ● ●
Parch zwykły	74	● ● ● ● ●
Parch prószysty	73	● ● ● ● ●
Plamistość miąższu	98	● ● ● ● ●
PVY	11	● ● ● ● ●
Tolerancja na Yntn	96	● ● ● ● ●

Odporność na PCN

Ro1	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	3	● ● ● ● ●
Pa2	*3	● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Rak ziemniaka

F1	10	● ● ● ● ●
F2	*1	● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●


* HZPC własne analizy

Nawożenie

- Dostosuj nawożenie do analiz gleby .
- Azot (N): 100%w porównaniu do innych średnio późnych odmian. (wskazane ok. 200 kg N wliczając zawartość w glebie).
- Należy zastosować 2/3 przed sadzeniem oraz 1/3 przed kwitnieniem.



Ogólne porady dotyczące upraw



Przygotowanie sadzeniaków i sadzenie

- ROSI ma średni okres spoczynku.
- Nie należy sadzić ROSI do zbyt zimnej gleby.
- Należy sadzić kiedy sadzeniaki są pobudzone („otwarte oczka”).
- ROSI może być uprawiana na wszystkich typach gleby.
- Zaprawianie bulw i gleby podczas sadzenia, pozwoli zmniejszyć ryzyko wystąpienia Rizoktoniozy.
- Stosowanie środków zawierających azoxystrobinę na glebę, daje bardzo dobre rezultaty w ochronie przed chorobami grzybowymi roślin.



Uwagi dotyczące produkcji polowej

- Wschody są regularne z dobrym rozwojem naci ziemniaczanej.
- ROSI jest wrażliwa na metrybuzynę. Należy stosować tylko przed wschodami.
- Należy zastosować solidny program ochrony przed Alternaria.

Niszczanie naci ziemniaczanej i zbiór

- Przed wykonaniem desykacji należy upewnić się że skórka jest już wystarczająco dojrzała. Zapewni to dobrą jakość przechowywania.



Przechowywanie

- ROSI ma długi okres spoczynku. W pierwszych miesiącach można ją przechowywać w temperaturze otoczenia.
- Po zbiorach należy szybko osuszyć ziemniaki.
- Przechowuj w stabilnej temperaturze, nie niższej niż 6 °C. Wentylować należy regularnie ale krótko, żeby zapobiec akumulacji Co2.
- Do długotrwałego przechowywania, niezbędne jest stosowanie produktów powstrzymujących kiełkowanie.
- Wszelkie wahania temperatury połączone z kondensacją, zwiększają ryzyko kiełkowania oraz wystąpienia parcha srebrzystego

