

IRYS

*Odmiana zalecana
na wczesny zbiór*

Charakterystyka ogólna :

- odmiana bardzo wczesna (91 dni wegetacji),
- biała barwa miąższu oraz żółta barwa skórki,
- owalno podłużny kształt bulw,
- średnio płytka głębokość oczek (5),
- potencjalny poziom plonowania- 35,0 t/ha (wg COBORU),
- typ kulinarny B czyli sałatkowy do ogólnoużytkowego,
- zawartość skrobi 12,9 %,
- posiada standardową trwałość przechowalniczą,
- jedna z popularniejszych odmian ziemniaka w Polsce o białej barwie miąższu.

BARDZO WCZESNA

ODMIANY JADALNE




WCZESNY
ZBIÓR



Cechy odpornościowe odmiany:

ODPORNOŚĆ	na wirusy	średnia odporność
	na parch	średnio wrażliwa
	zarazę ziemniaczaną	średnio wrażliwa
	suszę	średnio odporna
	uszkodzenia mechaniczne	podatna
	metrybuzynę powschodowo	wrażliwa



Zalecenia uprawowe

Irys ma wymagania glebowe **średnie do wysokich**. W rozstawie rzędów 75 cm w kalibrażu 35-55 mm należy sadzić co 28-30 cm. Zalecana głębokość sadzenia to około 14 cm. Temperatura gleby w czasie sadzenia powinna wynosić 8-10 stopni C na głębokości sadzenia bulw.



Zalecenia nawozowe*

Na glebach o średniej zawartości fosforu i potasu – nawożenie powinno wynosić 60 kg P₂O₅/ha oraz 250 kg K₂O/ha. Dawki należy pomniejszyć kiedy stosowano nawozy organiczne lub poplony. Zalecana dawka azotu wynosi od 120-140 kg N/ha łącznie z azotem dostępnym z nawozów organicznych i poplonów. Dawkę azotu dzielimy na dwie dawki. Pierwszą w ilości 100 kg N/ha stosujemy przed sadzeniem, a pozostałą część stosujemy przed zakryciem międzyrzędzi przez rośliny. Przy braku prób glebowych na zawartość makroskładników w glebie, nawozić NPK w stosunku 1:0,5-1:1,5-2. Zalecane jest nawożenie magnezem, siarką oraz mikroelementami.

**przykładowe nawożenie dla gleby średniej o uregulowanym pH gleby w celu uzyskania potencjalnego plonu (35,0 t/ha).*

www.pmh.z.pl