

TONACJA

*Odmiana zalecana
na wczesny zbiór*

Charakterystyka ogólna :

- odmiana bardzo wczesna (83 dni wegetacji),
- jasnożółta barwa miąższu,
- żółta barwa skórki,
- owalny kształt bulw,
- płytka głębokość oczek (7),
- potencjalny poziom plonowania- 52,0 t/ha (wg COBORU),
- typ kulinarny AB, czyli sałatkowy do ogólnoużytkowego,
- zawartość skrobi 11,6%,
- posiada standardową trwałość przechowalniczą.

BARDZO WCZESNA




WCZESNY
ZBIÓR



Cechy odpornościowe odmiany:

ODPORNOŚĆ	na wirusy	wysoka odporność
	na parch	średnio wrażliwa
	zarazę ziemniaczaną	średnio wrażliwa
	suszę	średnio wrażliwa
	uszkodzenia mechaniczne	nie jest podatna
	metrybuzynę powschodowo	średnio wrażliwa



Zalecenia uprawowe

Tonacja ma **średnie** wymagania glebowe. W rozstawie rzędów 75 cm w kalibrzu 35-55 mm należy sadzić co 28-30 cm. Zalecana głębokość sadzenia to ok. 14 -15 cm. Temperatura gleby w czasie sadzenia powinna wynosić 8-10 stopni C na głębokości sadzenia bulw.



Zalecenia nawozowe*

Na glebach o średniej zawartości fosforu i potasu – nawożenie powinno wynosić 90 kg P₂O₅/ha oraz 350 kg K₂O/ha. Dawki należy pomniejszyć kiedy stosowano nawozy organiczne lub poplony. Zalecana dawka azotu wynosi od 80 do 100 kg N/ha łącznie z azotem dostępnym z nawozów organicznych i poplonów. Przy braku prób glebowych na zawartość makroskładników w glebie, nawozić NPK w stosunku 1:0,5-1:1,5-2. Zalecane jest nawożenie magnezem, siarką oraz mikroelementami.

**przykładowe nawożenie dla gleby średniej o uregulowanym pH gleby w celu uzyskania potencjalnego plonu (52,0 t/ha).*