

UPRAWA KOSTRZEWY CZERWONEJ

Wymagania glebowe:

Kostrzewa czerwona w uprawach na nasiona wymaga stanowisk umiarkowanie żyznych (gleby klasy IIb-IVb).

Siew:

Zalecany wysiew na plantacji nasiennej 7-8 kg/ha nasion. Zalecana szerokość międzyrzędzi ok. 25cm. Zakładanie plantacji nasiennych: jesienią jako wsiewka w zboża ozime lub wiosną jako wsiewka w zboża jare lub późną wiosną (od połowy czerwca do początku lipca) w zasiewie czystym bez rośliny towarzyszącej.

Nawożenie:

Nawożenie po zbiorze rośliny ochronnej lub w następnych latach: N – 30kg/ha, P₂O₅ – 80kg/ha, K₂O – 100kg/ha. Nawożenie azotowe w każdym roku użytkowania plantacji: jesienią w drugiej połowie października w ilości 30kg N/ha oraz wiosną jak najwcześniej 60kg N/ha.

Ochrona kostrzewy czerwonej:

Niszczanie chwastów dwuliściennych w zbożach środkiem Aminopielik D 450 SL w dawce 3l/ha lub Chwastox D 179 SL w dawce 5l/ha. Niszczanie chwastów jednoliściennych tj. miotła zbożowa, w pszenicy Puma Uniwersal 069 EW 1l/ha. Możliwość zastosowania środka Stomp 400 SC w dawce 3l/ha jesienią lub wczesną wiosną do niszczenia chwastów dwuliściennych i jednoliściennych tj. miotła zbożowa. Zapobieganie białośności – niszczenie roztocza i owadów. Oprysk środkiem Karate Zeon 050CS w dawce 0,15l/ha lub Decis 2,5 EC (0,3l/ha) w okresie strzelania w źdźbło, przed pojawieniem się kłosa.

Zbiór:

Zbiór nasion dwufazowy. Koszenie na pokosy 2-3 dni od początku osypywania się nasion. Młócenie po 3-6 dniach. Możliwość zbioru jednofazowego kombajnem przy pełnej dojrzałości nasion. Możliwość stosowania środków przyspieszających i wyrównujących dojrzewanie łąnu np. Harvade 250 EC lub Roundup do 2,5l/ha. Zalecany okres użytkowania plantacji nasiennych 1-2 lata.

Uprawa kostrzewy czerwonej została opracowana wg zaleceń Hodowli Roślin Bartązek.